

تاروزیس® ۵ درصد

کل تار

لوسيون موضعی

مورد مصرف:

لوسيون تاروزیس® از خارش پوست، سوزش، قرمزی، پوسته پوسته شدن مرتبط با پسوریازیس جلوگیری می‌کند و به درمان و بهبود آن کمک می‌کند.

روش مصرف:

قبل استفاده به خوبی تکان دهید.

قبل از مصرف، منطقه آسیب دیده را به خوبی شستشو دهید.
دو تا سه بار در روز بر روی منطقه آسیب دیده با استفاده از یک پارچه کتان بمالید.
یا برای استفاده از هر روش دیگری با پزشک مشورت شود.

هشدار:

وقتی از لوسيون تاروزیس® استفاده می‌نمایید:

- از تماس با چشم خودداری نمایید. در صورت تماس با چشم به طور کامل چشم را با آب شستشو دهید.
 - از یک امولینت (یا از کرم نرم کننده دست درمین®) برای نرم کردن پوست طی دوره درمان استفاده شود.
 - پس از مصرف دارو از معرض قرار گرفتن منطقه مورد استعمال دارو در برابر نور خورشید اجتناب شود.
 - اگر پس از استفاده منظم محصول بهبودی حاصل نگردید یا وضعیت بدتر شد حتماً درمان را متوقف نمایید و به پزشک مراجعه نمایید.
 - فقط برای استعمال خارجی می‌باشد. اشتعال زا است. از آتش و شعله دور نگه داشته شود.
 - دور از دسترس اطفال نگهداری گردد. اگر بلعیده شود فوراً با مرکز کنترل مسمومیت تماس حاصل نمایید.
 - پس از استفاده درب آن را محکم ببندید.
- در صورت مصرف همزمان با داروهای دیگر موضعی پزشک خود را مطلع نمایید.

موارد منع مصرف:

بدون مشورت با پزشک برای استفاده طولانی مدت استفاده نشود.

این محصول را در داخل یا اطراف مقعد یا در ناحیه تناسلی کشاله ران به جز مشاوره با پزشک استفاده ننمایید. قبل از مصرف برای استفاده در مناطق مختلف بدن حتماً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

شرایط نگهداری:

از یخ زدگی محافظت گردد.

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

قابل اشتعال، به دور از حرارت و شعله نگهداری شود.

دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

www.gilaranco.com

Email:info@gilaranco.com

 @gilaranco

 @gilaranco_pharma



منبع: BNF 69