



پرمترین - گیلارانکو ۱٪ پرمترین شامپو

دسته دارویی : شپش کش

موارد مصرف : شامپو پرمترین برای درمان آلودگی ناشی از شپش سرانسانی بکار برده می شود.
مقدار و نحوه مصرف : مصرف فقط یکبار از این دارو برای بیماران مبتلا به شپش سر تقریباً در تمامی موارد نتیجه درمانی مثبت دارد. ضمناً مصرف این دارو در انسان کمترین حدسمیت را نسبت به سایر فرآورده های مشابه دارد.
طریقه مصرف : ابتدا باید موها را با یک شامپوی دیگر بخوبی بشوید و سپس موها را بخوبی آب کشیده و خشک نمایید.
 آنگاه مقدار کافی از شامپو پرمترین (برای موهای بلند شامپوی کامل ، برای موهای متوسط ۳/۴ شامپو ، برای موهای کوتاه از نصف شامپو استفاده نمایید) را بکار ببرید تا تمام موها و پوست سر بخوبی به شامپو آغشته شود و اجازه دهید ۱۰ دقیقه در همان حالت باقی بماند سپس موها را شسته و بخوبی آب بکشید.

نحوه شانه کردن :

موهای سر را به چند قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را طبق روش زیر شانه نمایید.
 ابتدا موی سر را با شانه معمولی شانه کنید تا موها صاف و گره مو باز شود. سپس نوک شانه دندان ریز را به سمت خود گرفته و مقداری از مو را از کف سر به صورتی که شانه ابتدا چسبیده به کف سر باشد، به سمت انتهای مو شانه نمایید.
 بعد از هر بار شانه کردن با دستمال کاغذی شپش ها را از شانه جدا کنید و دستمال کاغذی را در کیسه پلاستیکی بریزید.
 موهای شانه شده را با یک کلیپس از قسمت های شانه نشده جدا نموده و قسمت های دیگر مو را به همین ترتیب تا شانه شدن تمامی موها ادامه دهید . سپس کلیپس ها را جدا نموده و مجدداً موها را با آب گرم شستشو دهید.

نکات قابل توصیه :

- ۱- تمام لباسها، ملحفه ها و حوله های بیمار باید با آب داغ شسته و یا با اسپری ویژه البسه درمین آغشته گردد.
 - ۲- تمامی افراد خانواده فرد مبتلا نیز همزمان باید درمان گردند.
 - ۳- برای جلوگیری از گسترش آلودگی، شانه و برس را نیز با شامپو پرمترین بشوید.
 - ۴- از تماس دارو با چشم ها و دهان خودداری گردد.
 - ۵- از مصرف شامپو پرمترین بطور معمولی و مرتب اجتناب شود.
 - ۶- این دارو برای استعمال خارجی است، لذا دور از دسترس اطفال نگهداری گردد.
 - ۷- از مصرف دارو روی زخمهای باز، خراشیدگی و بریدگیها اجتناب گردد.
- عوارض جانبی :** هر دارو به موازات اثرات درمانی خود اثرات جانبی را نیز به همراه دارد که تمامی این عوارض به یک باره در یک فرد ظاهر نمی شود. احساس سوزش ، گزش، اریتم و راش ممکن است ظاهر شود.
مصرف در بارداری : در صورت نیاز میرم، استفاده از دارو حداکثر دو بار در تمام طول آبستنی و شیردهی مجاز می باشد.
 مصرف در کودکان : برای کودکان زیر ۲ سال بی خطر بودن دارو هنوز ثابت نشده است .

مرحله دوم : حذف | مرحله اول : درمان

